



KELUAL DS

Shampooing traitant

- ✓ **Attaque:** 3x/semaine, pendant 2 semaines.
- Entretien:** 1x/semaine.



En alternance avec Elution,
shampooing rééquilibrant.

200 ml - CNK 4550588 - 400 ml - CNK 4550596

- ✓ **Usage:** Appliquer & rincer.
Renouveler l'application, laisser agir
3 minutes, puis rincer.
- ✓ **Aspect cosmétique:** Parfum agréable,
respecte les colorations, cheveux souples.
- ✓ Testé à partir de 12 ans.

Flacon 100 ml - CNK 4187225

LISTE INCI: WATER (AQUA), SODIUM LAURETH SULFATE, DECYL GLUCOSIDE, UNDECYLENAMIDOPROPYL BETAINE, CICLOPIROX OLAMINE, LACTAMIDE MEA, LAURYL BETAINE, CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERYL RHEINIC ACID, PIRACTONE OLAMINE, POLYQUATERNIUM-10, SODIUM CHLORIDE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE



DUCRAY
SCIENCE DERMATOLOGIQUE

KELUAL DS ORIGINAL

ANTI-PELLICULAIRE
SHAMPOOING TRAITANT
Pellicules sévères

ANTI-DANDRUFF
TREATMENT SHAMPOO
Severe dandruff

PIROCTONE/CICLOPIROX OLAMINE

TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE
TESTED UNDER DERMATOLOGICAL CONTROL 100 ml e

VISAGE & CORPS



KELUAL DS

Crème

Attaque:
1x/jour pendant 2 semaines

Entretien:
2x/semaine

Tube 40 ml
CNK 4626024



KELUAL DS

Gel nettoyant

1x/jour



Malassezia &
Pityriasis versicolor

Tube 200 ml
CNK 4626032

KELUAL DS ORIGINAL

Cuir chevelu sujet à la
DERMATITE SÉBORRHÉIQUE




LABORATOIRES
Pierre Fabre

MODE D'ACTION

Une action synergique permettant de rompre le cercle vicieux



Ciclopirox olamine
Piroctone olamine

CPO Association brevetée d'actifs antifongiques




EFFICACITÉ ANTIFONGIQUE

Comparaison de l'action antifongique vs. les molécules de références



RÉMANENCE D'ACTION

Jusqu'à 8 semaines sans poussées grâce à l'effet anti-récidive longue durée²



RÉSULTATS



Efficace contre **tous les symptômes** de la dermatite séborrhéique



-89% de pellicules²
-80% de démangeaisons²
-84% de rougeurs²

+74% de qualité de vie³

[1] Etude microbiologique interne réalisée in vitro sur les souches de *Malassezia Globosa* et *Restricta*. Comparaison de l'activité antifongique des molécules CPO 1,5%/PO 0,3% - Kétoconazole 2% - Ciclopirox olamine 1,5%. [2] Étude clinique de tolérance et d'efficacité réalisée sur 66 sujets présentant une dermatite séborrhéique légère à sévère associée à un prurit. Phase d'attaque: 3 applications par semaine pendant 2 semaines. Entretien: 1 application par semaine pendant 8 semaines. [3] Évaluation réalisée par le sujet sur l'amélioration de la qualité de vie à 15 jours sur 62 sujets.